Ficha Técnica

CABOZI SC
FORTALEZA

(CALCIO – BORO - ZINC)

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a)	Nombre comercial	:	CABOZI SC
b)	Nombre común	:	Calcio Boro Zinc
c)	Clase de uso	:	Nutriente foliar
d)	Formulación	:	Liquido suspensión concentrada
e)	Formulado por	:	Productos Biológicas para la Agricultura
f)	Procedencia	:	Perú

2. COMPOSICIÓN QUIMICA

Calcio (CaO) 11%
Boro.....1 %
Zinc. 2.5%
Ácidos Fúlvicos.....1 %
Acido Carboxílico 5%
Materia orgánica.....2 %
Aminoácidos… 1.0%
Quelatos….....1 %
Vitaminas 0.1%
Acondicionadores y diluyentes 75.4 %

3. PROPIEDADES FÍSICAS

a)	Aspecto	:	Suspensión concentrada
b)	Color	:	Cremoso
c)	Olor	:	Característico
d)	pH	:	3-4 (acido)
e)	Densidad	:	1.3-1.4
f)	Solubilidad	:	soluble en agua
g)	Estabilidad	:	Estable en condiciones normales en sus recipientes originales y almacenamiento por 2 años
h)	Corrosividad	:	No corrosivo
i)	Explosividad	:	No explosivo
j)	Incompatibilidad	:	El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales, a excepción de productos de reacción alcalina., sin embargo, se recomienda hacer una previa prueba de compatibilidad.

4. TOXICOLOGIA

Precauciones para su uso: Evite el contacto con los ojos y la piel, después de usar lávese bien con agua y jabón. Almacenar fuera del alcance de los niños. Mantener el envase en lugar fresco y aireado.

5. **MECANISMOS DE ACCION**: CABOZI SC, es un bionutriente, formulado con aminoácidos, ácidos

orgánicos, carbohidratos activos, ácido fólico y complejo vitamínico diseñado para promover el cuajado de flores y amarre de frutos, evitando su caída excesiva, así mismo favoreciendo además el aumento de peso, calibre y vida post cosecha de los frutos.

CABOZI SC, fortalece las paredes celulares de la planta, previniendo y corrigiendo los desórdenes fisiológicos como la pudrición apical de los frutos. Mejora el crecimiento de los tubos polínicos asegurando la polinización, fecundación y cuajado de los frutos, mejora el transporte de azucares a través de las células evitando la clorosis y promueve la generación de auxinas naturales que se reflejan en rendimiento de calidad y mayor vida de los frutos.

CABOZI SC, esta enriquecido con aminoácidos, ácidos fúlvicos y materia orgánica que favorecen la rápida absorción del calcio, boro y zinc, así también esta fortificado con micronutrientes quelatados que coadyuvan hacia una mejor translocación de los nutrientes.

6. **MODO DE APLICACIÓN: CABOZI SC**, puede ser usado en cualquier etapa de la planta, pero se recomienda usar en etapas iniciales de la planta para un perfecto crecimiento y desarrollo de la planta, puede aplicarse tanto por vía foliar.

   CABOZI SC, debe agitarse vigorosamente y hacer uso de agua limpia, para mezclas se recomienda seguir el siguiente orden:

   - Agua limpia
   - **CABOZI SC**
   - Fitosanitario

   Así mismo se recomienda aplicar el producto al inicio del día por las mañanas o a la caída del sol. NO aplicar en pleno sol.

7. **DOSIS Y APLICACION: CABOZI SC**, se recomienda en aplicaciones foliares de 1-3 L en 200 L.

8. **FITOTOXICIDAD Y RECOMENDACIONES**
   No es fitotóxico si se usa las dosis recomendadas. Es un producto **no tóxico,** sin embargo, se recomienda mantenerlo alejado de los niños, y utilizar para las aplicaciones las indumentarias mínimas de seguridad personal.

9. **COMPATILIBILDAD:**
   CABOZI SC, El producto es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales, a excepción de productos de reacción alcalina., sin embargo, se recomienda hacer una previa prueba de compatibilidad.

10. **PLAZO DE SEGURIDAD: CABOZI SC**, no necesita plazo de seguridad.

11. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Conservar en un lugar fresco, seco, bajo sombra y protegido. Guardar El producto en el envase original, etiquetado y cerrado en ambiente seco y fresco, bajo llave, lejos de alcance de los niños. No almacenar ni transportar junto con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Tiempo de vida útil: 2 años, en su envase cerrado y original.

12. **PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN:** No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Evitar el contacto directo con ojos, piel. Evite respirar el producto. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.

13. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos y piel, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber abundante agua. Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto.

14. **FORMULADOR Y DISTRIBUIDOR:** Producto Biológico para la Agricultura – PBA.

15. **RECOMENDACIONES DE USO**: la aplicación foliar y radicular, es para suplir las funciones principales del fosforo en la planta, en el campo de las enzimas participa en la cadena de transferencia de electrones en la fotosíntesis, y promueve la producción de la planta. AGITESE ENERGICAMENTE ANTES DE USAR.

CULTIVO	DOSIS L /Ha	DOSIS L/200 L	MOMENTO DE LA APLICACION
Cereales: Maíz, arroz, cebada, avena, trigo.	1 - 3	1	Antes de la floración, otra a la formación del espigado, y en pleno desarrollo del grano.
Alcachofa, quinua.	1 – 3	1	1° Inicio del brotamiento de la inflorescencia.
Algodón	1 – 3	1	1° Inicio de formación de los botones. 2° Inicio de formación de bellotas.
Melón zapallo, sandía, maracuyá, granadilla.	1 – 3	1	Antes de la floración femenina, luego otra al desarrollo del fruto, repetir con intervalos de 12 a 15 días hasta la cosecha.
Papa, kion, pepino	1 – 3	1	1° A los 20 días después del brotamiento. 2° luego del aporque.
Cebolla y ajo	1 – 3	1	Al inicio de 5 a 10 cm. de crecimiento, otra a los 30 días y 30 días antes de la cosecha
Fresa, Tomate, ají páprika y pimiento	1 – 3	1	Antes de la floración, otra en fructificación, repetir cada 15 días después hasta la cosecha.
Espárrago	1 – 3	1	Aplicar antes del inicio del capítulo y repetir 2 veces.
Cítricos, Mandarina, toronja, limón, naranja, arandano..	1 - 3	1	Al crecimiento, repetir antes de la floración, durante el cuajado, otra durante el crecimiento de fruto.
Vid	1 – 3	1	Antes de la pre-floración y otra al cuajado y crecimiento del racimo.
Palto, melocotón, manzano, cacao.	1 – 3	1	Antes de la floración y luego después del cuaje, y otra al crecimiento del fruto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.